

Relationship between Pregnancy Stress and Spiritual Health in Mothers Referring to Selected Centers of Qazvin University of Medical Sciences

Saeideh Hosainin¹, Zohreh Mahmoodi^{2*}, Mansoureh Yazdkhasti², Farnoosh Moafi Ghafari³, Mahrokh Dolatian⁴, Seyed Hamid Reza Kamran Rad⁵

Abstract

Background and Purpose: Pregnancy is one of the most stressful periods in a woman's life. Several factors, such as spiritual health, can affect mothers' adaptation to these conditions. The present study aimed to investigate the relationship between stress during pregnancy and spiritual health.

Materials and Methods: The present descriptive study was conducted in 2021 on 352 eligible pregnant women referring to selected centers of Qazvin University of Medical Sciences. Sampling was performed via the convenience method and continued until data saturation. The information was collected by two questionnaires and a checklist, including a social personality checklist, Poltsen-Ellison spiritual health questionnaire, and Pregnancy-Related Anxiety Questionnaire (PRAQ). The data were analyzed in SPSS statistical software (version 25) using a linear regression test to examine the relationship between pregnancy stress and and spiritual health.

Results: Based on the present findings, the mean age of participating women was 28.6 ± 1.8 years, the spiritual health score was 104.3 ± 14.9 , and the pregnancy anxiety score was 37.2 ± 20.8 . The results of the ANOVA test demonstrated that spiritual health was correlated with the number of pregnancies ($P=0.012$). Pregnancy stress showed a significant relationship with gravida ($P<0.001$), parity ($P<0.001$), and the number of children ($P<0.001$). Moreover, based on the linear regression results, spiritual health ($B=-0.216$) had a significant relationship with stress and was a negative predictor. In other words, an increase of one score of spiritual health decreases stress by 0.302.

Conclusion: Maternal health has been one of the most important health issues in countries. The present study confirmed the relationship between spiritual health and pregnancy stress. Accordingly, this experience can be used to help mothers manage pregnancy stress and anxiety.

Keywords: Anxiety, Mothers, Pregnancy, Spiritual health, Stress

- 1- Student Research Committee, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
- 2- Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
- 3- Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
- 4- Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
- 5- Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

*Corresponding Author:

Zohreh Mahmoodi
Social Determinants of Health Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran

Email:

zohrehmahmoodi2011@gmail.com

Received: 20 Jul 2023

Revised: 01 May 2023

Accepted: 24 Jul 2023

► **Citation:** Hosainin S, Mahmoodi Z, Yazdkhasti M, Moafi Ghafari F, Dolatian M, Kamran Rad S H R. Relationship between Pregnancy Stress and Spiritual Health in Mothers Referring to Selected Centers of Qazvin University of Medical Sciences. Religion and Health, Spring & Summer 2023; 11(1): 55-64 (Persian).

ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی در مادران مراجعه‌کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سعیده حسینی^۱، زهره محمودی^{۲*}، منصوره یزدخواستی^۲، فرنوش معافی^۳، ماهرخ دولتیان^۴، سید حمیدرضا کامران راد^۵

چکیده

سابقه و هدف: بارداری یکی از دوران‌های پراسترس زندگی زنان است. عوامل متعددی مانند سلامت معنوی در سازگاری مادر با این دوران می‌توانند مؤثر باشند. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی طراحی و اجرا شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر به صورت توصیفی در سال ۱۴۰۰ بر روی ۳۵۲ زن باردار واجد شرایط مراجعه‌کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین و به صورت در دسترس تا تکمیل حجم نمونه انجام شد. اطلاعات به وسیله‌ی دو پرسش‌نامه و یک چک‌لیست، شامل چک‌لیست مشخصات فردی و اجتماعی، پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی پولتن الیسون و پرسش‌نامه‌ی تنش و نگرانی بارداری جمع‌آوری شد. داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS25 و آزمون رگرسیون خطی به منظور بررسی ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های حاضر، میانگین سن زنان شرکت‌کننده $28/6 \pm 1/8$ ، نمره‌ی سلامت معنوی $14/9 \pm 3/4$ و تنش و نگرانی بارداری $20/8 \pm 3/7$ بود. نتایج آزمون ANOVA نشان داد که سلامت معنوی با متغیر تعداد بارداری ارتباط معناداری داشت ($P=0/012$). تنش و نگرانی بارداری با تعداد بارداری ($P<0/001$)، تعداد زایمان ($P<0/001$) و تعداد فرزندان ($P<0/001$) ارتباط معنی‌داری داشته‌اند. همچنین، بر اساس نتایج رگرسیون خطی، متغیر سلامت معنوی ($B=-0/216$) با تنش و نگرانی ارتباط معنی‌داری داشت و پیش‌گویی‌کننده‌ی منفی بود. به عبارتی، با افزایش یک نمره سلامت معنوی، $0/302$ واحد از تنش و نگرانی کاهش می‌یابد.

استنتاج: سلامت مادران همواره از موضوعات مهم بهداشتی کشورها بوده است. در مطالعه‌ی حاضر، ارتباط سلامت معنوی و تنش و نگرانی بارداری تأیید شد؛ بر همین اساس، می‌توان از این تجربه به منظور کمک به مادران برای مدیریت تنش و نگرانی بارداری کمک گرفت.

واژه‌های کلیدی: سلامت معنوی، تنش، نگرانی، بارداری، مادران

- ۱- کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
- ۲- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
- ۳- دانشکده‌ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
- ۴- دپارتمان مامایی بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
- ۵- دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

* مؤلف مسئول:

زهره محمودی
دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران

Email:
zohrehmahmoodi2011@gmail.com

دریافت: ۲۹ تیر ۱۴۰۱

اصلاحات: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

پذیرش: ۰۲ مرداد ۱۴۰۲

◀ **استناد:** حسینی، سعیده؛ محمودی، زهره؛ یزدخواستی، منصوره؛ معافی، فرنوش؛ دولتیان، ماهرخ؛ کامران راد، سید حمیدرضا. ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی در مادران مراجعه‌کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین. دین و سلامت، بهار و تابستان ۱۴۰۲؛ ۱۱(۱): ۶۴-۵۵

مقدمه

اگرچه بارداری اتفاق بسیار خوشایندی برای مادر و خانواده است، گاهی می‌تواند برای مادر با تنش و نگرانی‌های خاصی همراه باشد (۱). مطالعات نشان می‌دهند که درصد درخور توجهی از زنان باردار درجاتی از نگرانی را در طی دوران بارداری تجربه می‌کنند (۲). این اختلال به‌عنوان مفهومی سایکولوژیک دارای اهمیت است و می‌تواند اثرهای نامطلوب فیزیولوژیک و سایکولوژیک را برای مادر به همراه داشته باشد (۳)، به‌طور مثال داشتن تصور منفی از زایمان و تولد فرزند، ترس از زایمان، تجربه‌ی ناخوشایند از زایمان، کاهش کیفیت زندگی، اختلالات خواب و اختلال در انجام امور روزانه‌ی مادر از جمله‌ی این اثرها هستند. نحوه‌ی مقابله با این وضعیت تنش‌زا در افراد مختلف، متفاوت است. برخی از مادران با استفاده از مکانیسم‌های دفاعی و سازگارانه‌ی صحیح به‌شکل موفقیت‌آمیز آن را مدیریت و رفع می‌کنند و برخی قادر به مدیریت آن نیستند و همین امر با بروز مشکلات و اختلالاتی برای مادر و نوزادش همراه می‌شود (۱).

سلامت معنوی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت انسان، هماهنگ‌کننده‌ی ارتباط بین نیروهای داخلی فرد است و با ویژگی‌هایی نظیر ثبات در زندگی، صلح و نوع‌دوستی، تناسب و هماهنگی با خود، دیگران و محیط، احساس ارتباط نزدیک با خویشان، خدا، جامعه و محیط خود را نشان می‌دهد (۴)؛ همچنین، در هماهنگی سایر ابعاد سلامت شخص نقشی درخور توجه ایفا می‌کند (۵). این بعد از سلامت می‌تواند به زندگی شخص معنا و مفهوم دهد و امید و آرامش درونی بیشتر را برای او به ارمغان بیاورد (۶). مطالعات متعددی در حمایت از این فرضیه وجود دارد که سلامت معنوی می‌تواند توانایی‌های روانی شخص را تقویت و سازگاری وی را با شرایط استرس‌زا تسهیل کند (۷). می‌توان گفت که سلامت معنوی یکی از مفاهیم اساسی چگونگی رویارویی با مشکلات و تنش ناشی از بیماری محسوب می‌شود (۶).

ضرورت تحقیق

در سالیان اخیر، به‌شکل قابل ملاحظه‌ای، محققان به این بعد از سلامت توجه کرده‌اند (۸)؛ اما در مرور متون مرتبط، مطالعه‌ای که به ارتباط سلامت معنوی با تنش و نگرانی بارداری بپردازد، مشاهده نشد؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت سلامت مادران و ویژگی‌های منحصربه‌فرد سلامت معنوی به‌عنوان یک مکانیسم سازگاری در وضعیت بحرانی، این مطالعه با هدف ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی در مادران مراجعه‌کننده به مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ۱۴۰۰ انجام شد.

مواد و روش‌ها

گزارش حاضر بخشی از نتایج مطالعه‌ی آینده‌نگر و طولی است. مطالعه‌ی حاضر به‌صورت توصیفی، در سال ۱۴۰۰ روی ۳۵۲ زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و بیمارستان‌های کوثر و شفا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شرح زیر انجام شد. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس تا تکمیل حجم نمونه از بین مراجعان انجام شد.

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: بودن در چهار هفته‌ی آخر بارداری، نداشتن بارداری‌های پرخطر مانند چندقلویی، پره اکلامسی، دیابت بارداری، نداشتن بیماری روانی طبق گفته‌ی خود فرد یا ثبت‌شده در پرونده، مصرف‌نکردن داروهای ضدافسردگی و اضطراب براساس پرونده و گفته‌ی خود بیمار. معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از: تکمیل ناقص پرسش‌نامه‌ها، مراجعه به سایر بیمارستان‌ها، رخ دادن هرگونه وضعیت و حادثه‌ی نامطلوب در طی مطالعه.

حداقل حجم نمونه‌ی لازم براساس مطالعه‌ی زمانی و همکاران (۹) و با در نظر گرفتن خطای نوع اول ۰/۰۵ برای آزمون دوطرفه ($\alpha = 0.05$) و خطای نوع دوم ۰/۲ ($\beta = 0.2$) (توان آزمون ۰/۸) با استفاده از فرمول زیر به دست آمد:

$$n = \frac{\left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} + z_{(1-\beta)} \right)^2}{r^2} + 3$$

مخالفت تا کاملاً موافق دسته‌بندی شد. رضایی و همکاران روایی و پایایی این ابزار را در حد مطلوب گزارش کرده‌اند. آن‌ها پایایی ۰/۷۹ را برای این ابزار گزارش کرده‌اند (۱۱).

پرسش‌نامه‌ی تنش و نگرانی بارداری

به‌منظور بررسی تنش و نگرانی مادران باردار از پرسش‌نامه‌ی تنش و نگرانی بارداری Huizink AC استفاده شد که در ایران، نویدپور و همکاران در سال ۲۰۱۶ آن را روان‌سنجی کرده‌اند (۱۲). این پرسش‌نامه دارای ۶ بعد و ۲۵ سؤال است. پاسخ سؤالات به‌صورت لیکرت پنج‌گزینه‌ای از هرگز تا همیشه است. به‌گزینه‌ی هرگز نمره‌ی صفر و به‌گزینه‌ی همیشه نمره‌ی ۴ اختصاص داده شده است. نمره‌ی نهایی این ابزار بین صفر تا ۱۰۰ است. کسب نمره‌ی بالاتر از این ابزار نشان‌دهنده‌ی تنش و نگرانی بیشتر مادر باردار است. برآورد روایی این پرسش‌نامه با استفاده از روایی صوری، محتوا و سازه تأیید شده است. نسبت روایی محتوای این پرسش‌نامه بین ۰/۵۵ تا ۱ است. روایی سازه که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام شد نیز مناسب‌بودن پرسش‌نامه را تأیید کرد؛ همچنین، آلفای کرونباخ ۰/۸۹ این پرسش‌نامه ثبات داخلی بالای آن را نشان داده است. لازم است ذکر شود که پرسش‌نامه‌ی «تنش و نگرانی بارداری» در روایی ملاکی با پرسش‌نامه‌ی اضطراب اشپیل برگر هم‌بستگی قابل‌قبولی را نشان داده است (۱۲). در مطالعه‌ی حاضر، پایایی آن با آلفای کرونباخ ۰/۸۸ تأیید شد.

پس از کسب مجوزهای لازم و کسب کد اخلاق از کمیته‌ی اخلاق دانشگاه علوم پزشکی البرز به شماره‌ی IR.ABZUMS.REC.1399.273، مطالعه آغاز شد. ابتدا از افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. اهداف مطالعه برای آن‌ها توضیح داده شد، به ایشان اطمینان داده شد که تمام اطلاعات آن‌ها محرمانه خواهد بود و شرکت‌نکردنشان در مطالعه مانع از دادن خدمات به آن‌ها نمی‌شود؛ همچنین، هر زمان که بخواهند می‌توانند از مطالعه خارج شوند، در صورتی که به شرکت در مطالعه تمایل داشتند، از آن‌ها درخواست شد که فرم رضایت‌نامه‌ی آگاهانه را مطالعه و

حداقل حجم نمونه ۳۰۲ نفر در نظر گرفته شد که با در نظر گرفتن ۱۵ درصد احتمال ریزش، ۳۵۲ نفر نمونه‌ی نهایی در نظر گرفته شد (۹).

گردآوری اطلاعات

اطلاعات به‌وسیله دو پرسش‌نامه و یک چک‌لیست شامل چک‌لیست مشخصات فردی و اجتماعی، پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی و پرسش‌نامه‌ی تنش و نگرانی بارداری جمع‌آوری شد.

۱. چک‌لیست متغیرهای فردی و اجتماعی

این چک‌لیست را براساس مرور متون مرتبط، محققان ساختند و شامل مواردی از قبیل سن، سن بارداری، تعداد زایمان، تعداد فرزندان، سابقه‌ی سقط، سابقه‌ی مرده‌زایی، سطح اجتماعی و اقتصادی، وضعیت بارداری (خواسته یا ناخواسته)، شغل مادر، تحصیلات مادر، شغل همسر، تحصیلات همسر، سن همسر، نحوه‌ی شروع دردهای زایمانی (خودبه‌خود یا القای زایمان)، شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان، جنس نوزاد، رتبه‌ی بارداری و قومیت بود.

۲. پرسش‌نامه‌ی سلامت معنوی

برای بررسی سلامت معنوی از پرسش‌نامه‌ی ۲۰ سؤالی سلامت معنوی پولتزرین و الیسون استفاده شد (۱۰). این پرسش‌نامه شامل ۲۰ سؤال است که ۱۰ سؤال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سؤال دیگر سلامت وجودی را اندازه‌گیری می‌کنند. دامنه‌ی نمره‌ی سلامت مذهبی و وجودی، هر کدام به‌تفکیک ۱۰ تا ۶۰ است. برای زیرگروه‌های سلامت مذهبی و وجودی، سطح‌بندی وجود ندارد و قضاوت براساس نمره‌ی به‌دست‌آمده صورت می‌گیرد. هرچه نمره‌ی به‌دست‌آمده بالاتر باشد، نشانه‌ی سلامت مذهبی و وجودی بالاتری است. نمره‌ی سلامت معنوی، جمع این دو زیرگروه است که دامنه‌ی آن ۲۰ تا ۱۲۰ در نظر گرفته شده است. گرفتن نمره‌ی بالاتر از این ابزار نشان‌دهنده‌ی سلامت معنوی بیشتر است. پاسخ سؤالات به‌صورت لیکرت شش‌گزینه‌ای از کاملاً

بودند (۸۷/۲ درصد). میانگین (انحراف معیار) نمره‌ی سلامت معنوی (۱۴/۹) (۱۰۴/۳) و نمره‌ی کل تنش و نگرانی بارداری (۲۰/۸) (۳۷/۲) بود. (جدول ۱).

نتایج آزمون ANOVA نشان داد که سلامت معنوی با متغیر تعداد بارداری ارتباط معنی‌داری داشت ($P=0/012$); همچنین، نتایج آزمون Independent Sample Test نشان داد که سلامت معنوی با نوع بارداری ارتباط دارد، به‌طوری که میانگین نمره‌ی سلامت معنوی در بارداری خواسته به‌طور معنی‌داری از بارداری ناخواسته بالاتر بود ($P=0/028$) و با سایر متغیرهای دموگرافیک نظیر سن، تحصیلات مادر، شغل مادر و قومیت مادر ارتباط معناداری نداشت (جدول ۲).

نتایج آزمون ANOVA نشان داد که تنش و نگرانی بارداری با تعداد بارداری ($P<0/001$)، تعداد زایمان ($P<0/001$) و تعداد فرزندان ($P<0/001$) ارتباط معنی‌داری داشت. نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که نمره‌ی تنش و نگرانی بارداری مادرانی که فرزند نداشتند، از افرادی که یک ($P=0/020$)، دو ($P<0/001$) و چهار و بیشتر ($P=0/019$) فرزند داشتند بالاتر بود و با سایر متغیرهای دموگرافیک نظیر سن، تحصیلات مادر، شغل مادر و قومیت مادر ارتباط معناداری نداشت (جدول ۳).

امضا کنند. از مادران که در طی ۴ هفته‌ی آخر بارداری خود برای دریافت خدمات به مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های منتخب مراجعه می‌کردند، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ها را مطالعه کنند و در صورت وجود هر گونه ابهام، محقق در محل حضور داشت و پاسخ‌گوی سؤالات آن‌ها بود. پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات بازبینی شدند و اطلاعات پرسش‌نامه‌هایی که تکمیل بودند، وارد نرم‌افزار SPSS25 شدند.

به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا نرمال بودن متغیرها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شد. از شاخص‌های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی استفاده شد، به‌منظور مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس و به‌منظور بررسی ارتباط هر کدام از دو متغیر وابسته‌ی فوق با متغیرهای مستقل از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته‌ها

در مطالعه‌ی حاضر، اطلاعات ۳۵۲ مادر تجزیه و تحلیل شد. میانگین سن مادران شرکت‌کننده در مطالعه $28/6 \pm 1/8$ بود و اکثر آن‌ها دارای تحصیلات دیپلم و کمتر

جدول ۱: مشخصات دموگرافیک زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر قزوین در سال ۱۴۰۰

متغیرهای کمی	میانگین \pm انحراف معیار
سن مادر	۲۸/۶ \pm ۱/۸
سن همسر	۳۳/۶ \pm ۶/۲
سن بارداری	۲۸/۲ \pm ۰/۲
وضعیت اقتصادی و اجتماعی	۱۲/۳ \pm ۲/۶
متغیرهای کیفی	فراوانی (%)
تحصیلات مادر	دیپلم و پایین‌تر (۸۷/۲) ۳۰/۷ فوق دیپلم (۲/۶) ۹
تحصیلات همسر	لیسانس و بالاتر (۱۰/۲) ۳۶ بی‌سواد (۲/۶) ۹ ابتدایی (۱۹/۳) ۶۸ راهنمایی (۳۵/۲) ۱۲۴ دیپلم (۳۱/۵) ۱۱۱
شغل مادر	لیسانس و بالاتر (۱۱/۴) ۴۰ خانه‌دار (۹۵/۵) ۳۳۶ آزاد (۲) ۷ کارمند (۲/۶) ۹



جدول ۲: وضعیت سلامت معنوی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر قزوین برحسب عوامل دموگرافیک در سال ۱۴۰۰

P	t	F	(انحراف معیار) میانگین	متغیرها
**۰/۰۱۲		۳/۲۵۶	۱۰۵/۱ (۱۴/۰)	۱
			۱۰۲/۳ (۱۴/۱)	۲
			۱۰۶/۱ (۱۷/۵)	۳
			۱۰۰/۲ (۱۴/۸)	۴
			۱۱۲/۵ (۶/۹)	۵ و بیشتر
**۰/۲۷۰		۱/۲۹۹	۱۰۵/۰ (۱۴/۲)	ندارد
			۱۰۳/۵ (۱۶/۸)	۱
			۱۰۳/۱ (۱۳/۹)	۲
			۱۰۴/۵ (۱۳/۳)	۳
			۱۱۵/۰ (۴/۲)	۴ و بیشتر
**۰/۳۸۴		۱/۰۴۵	۱۰۵ (۱۴/۱)	ندارد
			۱۰۳/۷ (۱۶/۷)	۱
			۱۰۳ (۱۳/۹)	۲
			۱۰۴/۸ (۱۳/۹)	۳
			۱۱۴/۳ (۳/۹)	۴ و بیشتر
*۰/۰۲۸	۲/۲۰۸	۱/۳۹۷	۱۰۴/۲ (۱۵/۰)	خیر
			۱۰۵/۶ (۱۴/۰)	خواسته
			۱۰۲ (۱۶/۱)	ناخواسته
*۰/۴۹۶	۰/۶۸۲	۰/۰۱۴	۱۰۴/۷ (۱۵/۴)	خودبه‌خود
			۱۰۳/۶ (۱۴/۱)	القاشده
			۱۰۲/۸ (۱۶/۳)	دختر

*Independent Sample Test **ANOVA

جدول ۳: وضعیت تنش و نگرانی بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر قزوین برحسب عوامل دموگرافیک در سال ۱۴۰۰

P	t	F	(انحراف معیار) میانگین	متغیرها
**<۰/۰۰۱		۵/۱۱۷	۴۳/۵ (۲۰/۱)	۱
			۳۷/۲ (۲۰/۹)	۲
			۳۲/۷ (۱۹/۱)	۳
			۳۴/۹ (۲۱/۹)	۴
			۲۶/۶ (۲۰/۲)	۵ و بیشتر
**<۰/۰۰۱		۶/۵۹۲	۴۳/۶ (۲۰/۳)	ندارد
			۳۵/۲ (۲۰/۹)	۱
			۳۰/۷ (۱۷/۹)	۲
			۳۶/۹ (۲۱/۹)	۳
			۲۱/۸ (۲۰/۸)	۴ و بیشتر
**<۰/۰۰۱		۶/۸۵۲	۴۳/۳ (۲۰/۴)	ندارد
			۳۵/۵ (۲۱/۱)	۱
			۲۹/۸ (۱۶/۷)	۲
			۳۸/۶ (۲۲/۸)	۳
			۱۹/۱ (۲۰/۹)	۴ و بیشتر
*۰/۲۵۳	۱/۱۴۶	۰/۶۴۷	۳۷/۱ (۲۰/۹)	خیر
			۳۸/۲ (۲۰/۵)	خواسته
			۳۵/۵ (۲۱/۴)	ناخواسته



ادامه جدول ۳					
نوع زایمان	خودبه خود القاشده	۳۷/۵ (۲۱/۴)	۱/۴۲۱	۰/۳۱۱	*۰/۷۵۶
		۳۶/۸ (۱۹/۸)			
جنسیت نوزاد	پسر دختر	۳۸ (۲۰/۲)	۰/۵۸۲	۰/۷۸۶	*۰/۴۳۳
		۳۶/۳ (۲۱/۵)			

*Independent Sample Test **ANOVA

تعیین می‌کنند. متغیر سلامت معنوی ($B = -0.216$) با تنش و نگرانی ارتباط معنی‌داری دارد و پیش‌گویی‌کننده‌ی منفی است؛ به عبارتی، با افزایش یک نمره سلامت معنوی، 0.302 واحد از تنش و نگرانی کاهش می‌یابد.

به‌منظور مشخص کردن ارتباط سلامت معنوی با تنش و نگرانی بارداری از روش رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج جداول شماره‌ی ۴ و ۵ نشان داد که متغیرهای پیش‌بینی‌کننده $1/06$ درصد از تغییرات متغیر ملاک را

جدول ۴: ارتباط تنش و نگرانی بارداری با سلامت معنوی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر قزوین برحسب

عوامل دموگرافیک در سال ۱۴۰۰

P	t	Beta	S.E.	B	متغیر پیش‌بین
<۰/۰۰۱	۴/۹۴۷		۶۵/۴۱۸	۸۱/۲۱۲	مقدار ثابت
۰/۲۴۶	۱/۱۶۲	۰/۱۱۰	۰/۲۹۰	۰/۳۳۷	سن مادر
۰/۲۹۹	-۱/۰۴۰	-۰/۰۹۵	۰/۳۰۴	-۰/۳۱۶	سن همسر
۰/۳۳۷	۰/۹۶۲	۰/۰۵۳	۷/۲۳۵	۶/۹۵۶	فوق دیپلم
۰/۸۵۹	-۰/۱۷۸	-۰/۰۱۱	۴/۲۴۹	-۰/۷۶۶	لیسانس
۰/۲۴۵	-۱/۱۶۵	-۰/۰۷۱	۲۳/۷۲۱	-۲۷/۶۴۷	فوق لیسانس و بالاتر
۰/۰۶۷	-۱/۸۳۵	-۰/۱۴۴	۷/۸۱۲	-۱۴/۳۳۷	خانه‌دار
۰/۴۸۰	-۰/۷۰۶	-۰/۰۵۲	۱۰/۹۶۱	-۷/۷۴۴	آزاد
۰/۷۰۹	۰/۳۷۴	۰/۰۲۰	۱۰/۵۲۶	۳/۹۳۲	بیکار
-۰/۸۲۸	-۰/۲۱۷	-۰/۰۱۳	۶/۶۹۶	-۱/۴۵۴	کارمند
۰/۵۰۰	۰/۶۷۵	۰/۰۹۲	۶/۳۴۲	۴/۲۸۳	۲
۰/۲۹۳	۱/۰۵۴	۰/۲۱۱	۹/۹۴۶	۱۰/۴۸۲	۳
۰/۴۴۷	۰/۷۶۲	۰/۱۵۷	۱۲/۶۹۲	۹/۶۷۱	۴
۰/۵۵۶	۰/۵۸۹	۰/۱۰۶	۱۶/۱۷۱	۹/۵۲۹	۵ و بیشتر
۰/۷۵۸	۰/۳۰۸	۰/۱۵۳	۲۱/۶۳۴	۶/۶۶۳	۱
۰/۸۲۸	-۰/۲۱۷	-۰/۱۴۷	۳۵/۹۶۷	-۷/۸۰۷	۲
۰/۹۲۸	۰/۰۹۱	۰/۰۵۰	۴۷/۶۲۸	۴/۳۲۵	۳
۰/۴۷۹	-۰/۷۰۸	-۰/۱۹۶	۴۱/۲۱۴	-۲۹/۱۷۸	۴ و بیشتر
۰/۶۱۸	-۰/۴۹۹	-۰/۰۷۲	۱۵/۹۶۶	-۷/۹۶۰	داشتن سابقه‌ی مرده‌زایی
۰/۲۲۸	۱/۲۰۸	۰/۱۳۸	۵/۳۸۸	۶/۵۱۰	نداشتن سابقه‌ی سقط
۰/۲۹۱	۱/۰۵۸	۰/۰۵۷	۲/۲۴۰	۲/۳۷۱	جنسیت فرزند پسر
۰/۶۷۹	۰/۴۱۵	۰/۰۲۳	۸/۱۷۵	۳/۳۹۲	شرکت‌نکردن در کلاس‌های آمادگی برای زایمان
۰/۸۰۹	۰/۲۴۲	۰/۰۱۴	۲/۵۵۹	۰/۶۱۸	ناخواسته
۰/۲۱۵	-۱/۲۴۲	-۰/۰۶۷	۲/۳۱۰	-۲/۸۶۹	القاشده
۰/۵۳۸	-۰/۶۱۷	-۰/۰۳۵	۰/۳۲۴-۲	-۰/۲۰۰	وضعیت اقتصادی و اجتماعی
<۰/۰۰۱	-۴/۰۴۰	-۰/۲۱۶	۰/۰۷۵	-۰/۳۰۲	نمره‌ی کل سلامت معنوی

جدول ۵: خلاصه‌ی مدل رگرسیون خطی چندگانه برای پیش‌بینی تنش و نگرانی با سلامت معنوی بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب شهر قزوین در سال ۱۴۰۰

S.E	Adj R2	R2	R
۱۹/۶۹۲	۰/۱۰۶	۰/۲۰۳	۰/۴۵۱

بحث

بارداری یکی از رویدادهای مهم در زندگی زنان است (۱۳). سلامت مادران به‌عنوان یکی از گروه‌های مهم جامعه همیشه مدنظر کشورها بوده است، به‌طوری که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت سلامت هر کشور نرخ مرگ‌ومیر مادران باردار است؛ بر همین اساس، نیاز به استفاده از روش‌ها، آموزش‌ها و حمایت‌های مناسب برای کاهش پیامدهای نامطلوب بارداری ضروری است.

براساس یافته‌های مطالعه‌ی حاضر، با افزایش نمره‌ی سلامت معنوی در زنان باردار، به‌میزان ۰/۳۰۲ واحد از تنش و نگرانی آن‌ها کاهش می‌یافت. مطالعه‌ی کمالی و همکاران در سال ۱۳۹۶ که به بررسی سلامت معنوی و تنش در مادران دارای کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه پرداخته است، نشان داد که سلامت معنوی در کاهش تنش و نگرانی مادران دارای کودک بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بسیار مؤثر است (میانگین نمره‌ی تنش و نگرانی از ۵/۱۴ به ۳/۱۴ کاهش یافته است) و از این نظر با نتایج مطالعه‌ی حاضر هم‌خوانی دارد. آن‌ها بیان کردند که سلامت معنوی به‌عنوان یک مکانیسم سازگاری می‌تواند به مادر باردار برای غلبه بر وضعیت و سازگاری خوب با شرایط تنش‌زای خود در طی بارداری کمک کند (۱۴).

اعتقادات و باورهای معنوی شخص منابعی هستند که بر چگونگی نگرش و پاسخ فرد به شرایط استرس‌زای زندگی تأثیر می‌گذارند. وجود اعتقاداتی نظیر ایمان به قدرت الهی، تقدیر و قضای الهی و سایر باورها درباره‌ی نظم و قوانین طبیعی حاکم بر جهان، فرد را قادر می‌سازند تا به چالش‌ها و استرس‌های اطراف پاسخ مناسب بدهد و با امید به زندگی ادامه دهد (۱۵). ربیع‌پور و همکاران (۲۰۱۹) بیان کردند که سلامت معنوی مفهومی چندبعدی است که اثر تجمیعی بر سلامت، به‌ویژه در دوران بارداری دارد (۱۶). نتایج اخیر با

مطالعات بدقی و همکاران و دولتیان و همکاران هم‌خوانی دارد. آن‌ها نیز در مطالعه‌ی خود دریافتند که اضطراب و افسردگی و استرس در زنان باردار با سلامت معنوی رابطه‌ی عکس و معنی‌داری دارند (۱۷، ۱۸). فروزنده و همکاران نیز در مطالعه‌ی خود دریافتند که بین سلامت معنوی و سبک‌های مقابله با استرس رابطه‌ی مثبتی وجود دارد (۱۹). ترک زهرانی و همکاران در مطالعه‌ی خود با عنوان دل‌بستگی مادر به کودک دریافتند که با افزایش سلامت معنوی مادر، دل‌بستگی وی به کودک افزایش می‌یابد (۲۰). زارعی‌پور و همکاران نیز در مطالعه‌ی خود دریافتند که سلامت معنوی بالاتر با خودکارآمدی بالاتر مادر باردار همراه است (۶). بارداری هرچند شادی‌بخش‌ترین مرحله‌ی زندگی زنان است، می‌تواند با چالش‌های جدی جسمی و روانی برای مادر همراه باشد. سلامت معنوی می‌تواند به‌عنوان یک مکانیسم سازگاری برای رویارویی با مشکل‌ها و تنش‌های این دوره به کار گرفته شود (۸). معنویت مهم‌ترین راهنما در رفتارهای حل مسئله‌ی فردی است. مطالعات نشان داده‌اند افرادی که از سطح بالای معنویت برخوردار هستند، بیشتر با مشکلات و شرایط زندگی سازگار می‌شوند. سلامت معنوی با مهار استرس و افزایش سلامت روانی اجتماعی در کاهش ترس از زایمان و تجربه‌ی خوشایند بارداری و زایمان نقش مؤثر دارد (۲۱)؛ به عبارتی، سلامت معنوی می‌تواند توانایی‌های روانی شخص را تقویت و سازگاری او را با شرایط استرس‌زا تسهیل کند (۲۲). می‌توان گفت که سلامت معنوی یکی از مفاهیم اساسی در چگونگی رویارویی با مشکلات و تنش ناشی از بیماری محسوب می‌شود (۲۳).

نتیجه‌گیری

مادران باردار تنش و نگرانی درخور توجهی را در طی بارداری تجربه می‌کنند و سلامت معنوی بالاتر آن‌ها سبب

بارداری انجام پذیرد.

حمایت مالی

مطالعه‌ی حاضر حاصل پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی است و معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی البرز آن را حمایت مالی کرده است.

ملاحظات اخلاقی

؟؟؟

تعارض منافع

هیچ‌گونه تعارض منافی در این مطالعه وجود نداشت.

تشکر و قدردانی

از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز و قزوین، کارکنان بیمارستان‌های محل نمونه‌گیری و همچنین، تمام زنان شرکت‌کننده در مطالعه کمال تشکر و قدردانی را می‌کنیم.

کاهش این تنش و نگرانی می‌شود. این موضوع می‌تواند در زمان مراقبت‌های مامایی جامع‌نگر استفاده شود، بدین صورت که در این دوران، جلسه‌ها و کلاس‌های مرتبط با آموزه‌های دینی برای مادران برگزار شود؛ زیرا معنویت یک مکانیسم سازگاری مثبت است که افراد را برای مقابله و مدیریت وضعیت استرس‌زا و ترس‌آور حمایت می‌کند و این موضوع ممکن است در زنان باردار نیز برای غلبه بر تنش‌ها و نگرانی‌های این دوران مؤثر باشد.

محدودیت‌ها

از محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان به استفاده از پرسش‌نامه و روش خودگزارش‌دهی برای تکمیل اطلاعات به‌تنهایی اشاره کرد.

پیشنهادات

با توجه به محدودیت مطالعات انجام‌شده در حوزه‌ی سلامت معنوی و مراقبت‌های مادری، توصیه می‌شود که در آینده، مطالعات بیشتری در همین رابطه در قومیت‌های دیگر انجام شود؛ همچنین، مطالعاتی در ارتباط با سلامت معنوی و آموزه‌های دینی و دیگر موضوعات مادران در دوران

References

1. Malakouti J, Mirghafourvand M, Salehi Pour Mehr H, Shamsaei F, Safari Komeil M. Maternal worries and their relationship with coping strategies in pregnant women referring to health centers in Hamadan. *Hayat*. 2018; 24(1):35-47 (Persian).
2. Lutterodt MC, Kähler P, Kragstrup J, Nicolaisdottir DR, Siersma V, Ertmann RK. Examining to what extent pregnancy-related physical symptoms worry women in the first trimester of pregnancy: a cross-sectional study in general practice. *BJGP Open*. 2019; 3(4).
3. Mortazavi F, Akaberi A. Worries of pregnant women: testing the Farsi Cambridge worry scale. 2016; 5791560.
4. Hajiesmaeili MR, Abbasi M, Jafari NJ, Abdoljabari M, Fani M, Mesri M, et al. Spiritual health concept: A hybridized study. *Medical History Journal*. 2016;6(21):15-49 (Persian).
5. Haji Rafiei E, Tork Zahrani S, Alavi Majd H, Nayebi Nia A. Spiritual health and its related factors in pregnant women presenting to health centers in Qazvin, Iran, In 2015. *Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty*. 2018; 16(4):225-33 (Persian).
6. Zareipour M, Abdolkarimi M, Asadpour M, Dashti S, Askari F. The relationship between spiritual health and self-efficacy in pregnant women referred to rural health centers of Uremia in 2015. *Community Health Journal*. 2015; 17(2):52-61 (Persian).
7. Karimi L, Shomoossi N, Safee Rad I, Ahmadi Tahor M. The relationship between spiritual well-being and mental health of university students. *Journal of Sabzevar University of Medical Sciences*. 2011; 17(4):274-80 (Persian).
8. Rahimnejad A, Davati A, Garshasbi A. spiritual health and anxiety in pregnant women referred to Shaheed Mostafa Khomeini Hospital in Tehran. *Daneshvar Medicine*. 2022; 29(6):14-23 (Persian).
9. Zamani P, Ziaie T, Lakeh NM, Leili EK. The correlation between perceived social support and childbirth experience in pregnant women.

- Midwifery. 2019; 75:146-51 (Persian).
10. Ellison CW. Spiritual Well-Being: Conceptualization and Measurement. *Journal of Psychology and Theology*. 1983; 11(4):330-8.
 11. Rezaei M, Adib-Hajbaghery M, Seyedfatemi N, Hoseini F. Prayer in Iranian cancer patients undergoing chemotherapy. *Complementary Therapies in Clinical Practice*. 2008; 14(2):90-7.
 12. Navidpour F, Dolatian M, Shishehgar S, Yaghmaei F, Majd HA, Hashemi SS. Validating the Farsi version of the pregnancy worries and stress questionnaire (PWSQ): An exploratory factor analysis. *Electronic Physician*. 2016; 8(10):3132-7.
 13. Fathnejad-Kazemi A, Nayebi Nia A, NayebiNia F. A review of the articles on the effect of the Qur'an on maternal and fetal outcomes: a brief report. *Journal of Religion and Health*. 2022; 9(2):81-8 (Persian).
 14. Kamali Z, Tafazoli M, Ebrahimi M, Hosseini M, Saki A, Fayyazi-Bordbar MR, et al. Effect of spiritual care education on postpartum stress disorder in women with preeclampsia. *Journal of Education and Health Promotion*. 2018; 7:73.
 15. Vafaei Fooladi A, Rassouli M, Yaghmaie F, Shakeri N. Assessing correlation between spiritual wellbeing and stress of mothers of hospitalized newborns in neonatal intensive care units. *Iran Journal of Nursing*. 2015; 28(95):54-62 (Persian).
 16. Rabiepoor S, Sadeghi E, Sayyadi H. Spiritual health and physical activity among Iranian pregnant women. *Journal of Religion and Health*. 2019; 58(2):506-15 (Persian).
 17. Bodaghi E, Alipour F, Bodaghi M, Nori R, Peiman N, Saeidpour S. The role of spirituality and social support in pregnant women's anxiety, depression and stress symptoms. *Community Health Journal*. 2017; 10(2):72-82.
 18. Dolatian M, Mahmoodi Z, Dilgony T, Shams J, Zaeri F. The structural model of spirituality and psychological well-being for pregnancy-specific stress. *Journal of Religion and Health*. 2017; 56(6):2267-75 (Persian).
 19. Foruzandeh Hafshejani M, Foruzandeh Hafshejani N, Darakhshandeh Hafshejani S, Deris F. Predicted coping styles with pregnancy-specific stress on basis of spiritual well-being. *Journal of Clinical Nursing and Midwifery*. 2018; 4(3) (Persian).
 20. Tork Zahrani S, Haji Rafiei E, Hajian S, Alavi Majd H, Izadi A. The Correlation between Spiritual Health and Maternal-Fetal Attachment Behaviors in Pregnant Women Referring to the Health Centers in Qazvin, Iran. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*. 2020; 8(1): 84-91 (Persian).
 21. Dehestani H, Moshfeghy Z, Ghodrati F, Akbarzadeh M. The relationship of spiritual health and mother's forgiveness with her anxiety in the labor of the pregnant women. *International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences*. 2019; 7(2):174-9.
 22. Moreira-Almeida A, Lotufo Neto F, Koenig HG. Religiousness and mental health: a review. *Brazilian Journal of Psychiatry*. 2006; 28:242-50
 23. Abu-Raiya H, Pargament KI, Krause N. Religion as problem, religion as solution: Religious buffers of the links between religious/spiritual struggles and wellbeing/mental health. *Quality of Life Research*. 2016; 25(5):1265-74